



INSTRUCCIONES POST-SEDACIÓN

1. Vaya a casa y descanse por el resto del día.
2. No realice ninguna actividad extenuante. Permanezca en compañía de un adulto responsable hasta que esté completamente alerta.
3. Abstenerse de intentar comer inmediatamente una comida pesada. Si tiene hambre, lo mejor es una dieta ligera (líquidos o alimentos blandos).
4. No conduzca un automóvil ni realice tareas peligrosas durante el resto del día.
5. Abstenerse de beber alcohol o tomar medicamentos sedantes durante las 12 horas posteriores al procedimiento.
6. Ocasionalmente se puede llegar a tener una sensación de náuseas después de la sedación IV o IM. Las siguientes instrucciones pueden ayudarlo a sentirse mejor:
 - Acuéstese con la cabeza levantada
 - Tomar un vaso de bebida carbonatada (cola o 7-Up)

Comuníquese con nuestra oficina si las náuseas persisten durante más de 4 horas para adultos o 1 hora para niños. Si las náuseas convierten en vomito, no se acueste boca arriba, ya que eso aumenta la probabilidad de aspiración.

7. Si tiene una emergencia o preguntas, llame a nuestra oficina al (704) 365-0123. Siempre hay un dentista de guardia.
8. En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida (dificultad para respirar o pérdida del conocimiento), llame al 911 de inmediato.